

GASTROSKOPIA - INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Data wydania informacji.....

Pan/Pani.....

Adres.....



Celem wyjaśnienia Pana/ Pani dolegliwości zalecone zostało badanie gastroscopowe. Istnieją dwa sposoby badania: 1/ endoskopowa ocena za pomocą kolonoskopu, 2/ ocena radiologiczna za pomocą środka kontrastującego podawanego doustnie. Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych lub są one niewielkie, a sama ocena jest znacznie dokładniejsza niż przy badaniu radiologicznym. W znacznym też stopniu eliminuje możliwość pominięcia zmian chorobowych. Pragniemy poinformować w tej ulotce oraz w rozmowie wyjaśniającej o przygotowaniu, przebiegu a także związanym z tym badaniem ryzyku i możliwych powikłaniach. Proszę wziąć pod uwagę, że może Pan/Pani zamiast na badanie endoskopowe zdecydować się na badanie radiologiczne, które ma tę zaletę, że jest nieinwazyjne.

Opis badania

Badanie gastroscopowe jest badaniem pozwalającym na ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka i dwunastnicy. Polega ono na oglądaniu wnętrza przewodu pokarmowego giętym optycznym lub elektronicznym przyrządem. Gastroscopia nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy, aby Pan/ Pani nic nie jadł i nie pił 6 godzin przed planowanym wykonaniem badania. Badanie jest przeprowadzane w ułożeniu na lewym boku. Po usunięciu ewentualnych protez zębowych, ewentualnym miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu, pomiędzy zęby wprowadzamy specjalny ustnik, przez który wprowadzany będzie endoskop / należy pamiętać o tym, by nie przygryźć zębami endoskopu, ponieważ grozi to jego zniszczeniem/. Następnie po przygięciu głowy wprowadza się do jamy ustnej giętki o niewielkiej średnicy ok. 1 cm endoskop, potem będzie Pan/ Pani poproszony o wykonanie odruchu połknięcia. Badanie trwa najczęściej kilka, kilkanaście minut. Jest w miernym stopniu nieprzyjemne. Do dokładnej oceny badanych narządów konieczne jest wdmuchanie przez endoskop powietrza, co może wywołać uczucie wzdęcia i odbijanie. W trakcie badania możliwe jest także pobieranie niewielkich wycinków do badania histopatologicznego /mikroskopowego/, co umożliwia późniejsze dokładne rozpoznanie. Pobieranie wycinków jest praktycznie niebolesne, wykonywane za pomocą specjalnie wysterylizowanych szczypczyków. Również sam endoskop jest do każdego badania specjalnie dezynfekowany.

Możliwe powikłania

Powikłania po endoskopii zdarzają się rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może dojść

do uszkodzenia gardła, krtani, przedziurawienia przelyku, żołądka, dwunastnicy. Powikłania takie wymagają szybkiego leczenia zwykle operacyjnego. Niekiedy może wystąpić krwawienie, najczęściej po pobraniu wycinków. Rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów takich jak : reakcji alergicznej na podawane leki , zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy, padaczki, a nawet zatrzymania krążenia - w sumie około 0,5% badań. Śmiertelność jest niezwykle rzadka.

Aby ograniczyć ryzyko krwawienia, a także zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z podawaniem leków prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy istnieje u Pana/ Pani zwiększona skłonność do krwawień, szczególnie po drobnych skaleczeniach, wyrwaniu zębów, bądź skłonność do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?

TAK NIE

Czy występowały u Pana/ Pani objawy uczulenia na środki spożywcze lub lecznicze? Jeśli tak to na jakie?

TAK NIE

Czy pobiera Pan/ Pani leki wpływające na krzepliwość krwi, np. Aspiryna, Acard, Bestpiryn, Acenokumarol, Sintrom, Warfin itp.?

TAK NIE

Czy jest Pani w ciąży?

TAK NIE

Postępowanie po badaniu

Aby uniknąć zadławienia z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno pić ani jeść przez okres 2 godzin po badaniu. Proszę także informować niezwłocznie swojego lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będzie Pan/ Pani odczuwać bóle w jamie brzusznej lub klatce piersiowej lub zaobserwuje Pan/ Pani czarny stolec . Również wystąpienie innych niejasnych dla Pana/ Pani objawów należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Po wykonaniu badania endoskopowym do końca dnia, w którym zostało wykonane badanie nie wolno prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn w ruchu .Po badaniu z pobraniem wycinków proszę nie jeść i nie pić przez 2 godziny oraz w tym dniu unikać gorących napojów i posiłków.

Oczekiwanie na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków może trwać około 3 tygodni. Proszę pytać, jeśli czegoś Pan/ Pani nie zrozumiał albo jeśli pragnie Pan/ Pani wiedzieć o tym badaniu, powikłaniach lub innych problemach związanych z proponowanym badaniem.

OŚWIADCZENIE PACJENTA

ŚWIADOMA ZGOGA NA BADANIE KOLONOSKOPWE

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego badania gastroscopowego, zapoznałem/am się z szczegółowym opisem badania , jego celowością , oczekiwanym wynikiem .O przebiegu badania i możliwych powikłaniach , możliwości wykonania innych alternatywnych badań diagnostycznych zostałem/am wyczerpująco poinformowany/a. Nie mam więcej pytań ani żadnych wątpliwości , uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i proszę o wykonanie proponowanego badania i ewentualnych zabiegów.

piotr@gastr0.pl